

INFORMATIVO A LOS PADRES

“VACUNACION ESCOLAR 2020”

1º BASICO

A) VACUNA TRIVIRICA

Vacuna que protege contra la Parotiditis (paperas), Rubéola y Sarampión

INDICACION : 1 año de edad y refuerzo en 1º básico.

CONTRAINDICACIONES : No deben colocársela las personas con Déficit Inmunológico y con alergia comprobada al huevo.

REACCIONES POST VACUNA: A partir del 5º día puede observarse reacciones como fiebre, síntomas rinofaríngeos leves o leve enrojecimiento.

DOSIS : 0.5 ml por **vía subcutánea** en el tercio medio del brazo derecho.

B) VACUNA DTPA acelular

Vacuna que protege contra la Difteria, el Tétanos y la Tos Convulsiva (Coqueluche)

INDICACION : A los 2, 4, 6 y 18 meses en la vacuna Pentavalente. Refuerzo en niños de 1º básico y 8º básico.

CONTRAINDICACIONES : No deben colocársela las personas con fiebre sobre 38.5 °C y con alergia comprobada al huevo.

REACCIONES POST VACUNA: Principalmente dolor e inflamación en el sitio de la punción por 1 o 2 días. En algunos casos puede presentar malestar general, fiebre después de 24 a 48 horas, dolor de cabeza, náuseas o diarrea.

DOSIS : 0.5 ml por **vía intramuscular** tercio superior del brazo izquierdo.

Se recuerda a los padres y profesores que la vacunación es de carácter obligatoria ya que son parte del calendario de vacunación de los niños, y son los refuerzos de vacunas que recibieron hasta los 18 meses de edad.

Los padres de los niños que presentan alergia comprobada al huevo, deben avisar a sus profesores por comunicación para que el día de la inmunización, estos no sean vacunados.

INFORMATIVO A LOS PADRES
“VACUNACION ESCOLAR 2020”
4° y 5° BASICO

VACUNA contra el VPH (Virus Papiloma Humano)

Vacuna que ayuda a prevenir y evitar la infección por este virus. El **VPH** es uno de los virus causantes, más a largo plazo de cáncer cérvico uterino en mujeres.

INDICACION:

Niñas y Niños de 4° año Básico

Niñas y niños en 5° año Básico (Refuerzo)

CONTRAINDICACIONES:

No deben colocársela las personas con fiebre sobre 38.5°C.

REACCIONES POST VACUNA:

Las reacciones son leves, cerca de 1% puede presentar fiebre, dolor y eritema. (Rojo en el sitio de punción).

DOSIS:

0.5 ml por **vía intramuscular** tercio superior del brazo izquierdo.

Se recuerda a los padres y profesores que la vacunación es de carácter obligatoria ya que esta vacuna es parte del calendario de vacunación.

INFORMATIVO A LOS PADRES
“VACUNACION ESCOLAR 2020”
8º BASICO

VACUNA DTPacelular

Vacuna que protege contra la **Difteria**, el **Tétanos** y la **Tos Convulsiva**
(**Coqueluche**)

INDICACION:

A los 2, 4, 6 y 18 meses en la vacuna Pentavalente.
Refuerzo en niños de 1º básico y 8º básico.

CONTRAINDICACIONES:

No deben colocársela las personas con fiebre sobre 38.5 °C y con alergia comprobada al huevo.

REACCIONES POST VACUNA:

Principalmente dolor e inflamación en el sitio de la punción por 1 o 2 días.
En algunos casos puede presentar malestar general, fiebre después de 24 a 48 horas, dolor de cabeza, náuseas o diarrea.

DOSIS:

0.5 ml por **vía intramuscular** tercio superior del brazo.

Se recuerda a los padres y profesores que la vacunación es de carácter obligatoria ya que esta vacuna es parte del calendario de vacunación de los niños y es el refuerzo de las vacunas que recibieron hasta los 18 meses de edad.